Practic®
» Flow

EDICIÓN ENERO 2014

SAPEC
AGRO ESPAÑA

www.sapecagro.es

Sapec Agro, S.A.U.

Parque Empresarial TÁCTICA
C/ Botiguers, nº 3 - 4ª Planta. 46980 – Paterna (Valencia)
**Telf.** 96 134 51 50 / **Fax.** 96 134 35 10

La información contenida en el presente folleto, no exime de seguir las indicaciones recogidas en etiqueta

# Practic®
# » Flow

## EL HERBICIDA DE LA LECHUGA

SAPEC
AGRO ESPAÑA

## Beneficios

### Eficacia y persistencia

Eficacia sobre las hierbas que nacen en meses posteriores al tratamiento.
Controla malas hierbas anuales de hoja ancha y gramíneas.

### Selectividad

Total seguridad sobre todas las variedades y tipos de suelo, sea cual sea la técnica de cultivo, adaptando la aplicación a las diferentes técnicas.

## Observaciones

La eficacia y la acción residual de **PRACTIC® Flow** dependen del tipo de suelo y la temperatura. Es más activo en suelos arenosos que en suelos con un alto contenido de materia orgánica y la persistencia es mayor en condiciones de baja temperatura.

**Cultivos siguientes:**

Los terrenos tratados deben ser arados a una profundidad de 15 cm antes de sembrar el cultivo siguiente, excepto cuando se trate de alcachofa, lechuga, endivia o escarola.

**Intervalo mínimo después del tratamiento para sembrar o plantar los cultivos siguientes:**

-Cultivos tolerantes: no se requiere periodo de espera para alcachofas, lechuga, endivia y escarola.

-Cultivos moderadamente tolerantes: aproximadamente cinco meses para leguminosas, maíz, sorgo, zanahorias, patatas, apio, fresas y algodón.

-Cultivos moderadamente sensibles: 7-8 meses para remolacha azucarera, espinacas, cucurbitáceas, crucíferas, coles, colza, cebollas, ajos, pimientos, tomates y berenjenas.

-Cultivos muy sensibles: 9-10 meses para cereales de grano, gramíneas forrajeras y céspedes.

Los periodos de espera dependen de las temperaturas y pueden reducirse en un clima cálido y seco.

# Practic® Flow

**PRACTIC® Flow** es un herbicida sistémico selectivo que se absorbe por las raíces.
Su acción residual permite un duradero control de las malas hierbas.

**Composición:** Propizamida 40% (SC)

## Aplicaciones autorizadas

Se recomienda para el control de malas hierbas anuales en lechuga y similares.

En aplicaciones de primavera-verano, **PRACTIC® Flow** es efectivo sobre malas hierbas en estado de pre-emergencia, mientras que en otoño-invierno (bajo condiciones de frio y humedad) también controla malas hierbas en estado de post-emergencia temprana.

## Dosis y modo de empleo

Frente a gramíneas y dicotiledóneas: 1,75-2,5 l/ha.

Aplicar en pulverización hidráulica dirigida al suelo a la dosis indicada usando un volumen de caldo de 500-600 l/ha. Solo al aire libre en aplicación única en pre-siembra / pre-trasplante o post-emergencia / pos-trasplante.

**Preparación de la mezcla:**

Añadir la mitad del volumen de agua necesario al tanque de pulverización y empezar la agitación. Agitar vigorosamente el envase de **PRACTIC® Flow** y añadir la cantidad de producto recomendado al tanque de pulverización. Completar con agua hasta el volumen de caldo necesario para tratar el área de cultivo. Mantener la agitación constante y continuada en el tanque durante la preparación de la mezcla y aplicación del producto. No permitir que repose la mezcla.

**Condiciones y momento de aplicación:**

El producto se absorbe por las raíces. Por lo tanto, es conveniente que haya humedad en el suelo en el momento de la aplicación. Realizar un riego si no llueve en los días siguientes a la aplicación. El riego preferentemente debe ser por aspersión, si fuese por surco o a manta, este tiene que ser muy suave.

En caso de riesgo de condiciones desfavorables al desarrollo de la lechuga después del transplante (humedades excesivas, saltos térmicos, suelos demasiado fríos especialmente en variedades tipo inverna), se recomienda la aplicación de **PRACTIC® Flow** en pre-transplante.

No usar en suelos con alto contenido en material orgánico o condiciones climáticas calurosas.

## Plazo de seguridad

30 días.

SAPEC AGRO ESPAÑA